

Aguilucho Lagunero Occidental (*Circus aeruginosus*)



¿Cómo es?

Esta rapaz diurna de la familia de los accipitriformes es de tamaño medio y aspecto estilizado. Viven en zonas de humedales, en particular en los que cuentan con extensas formaciones de carrizos, espadañas, enneas, juncos o masiegas. Presentan un acusado dimorfismo sexual, siendo la hembra más grande y pesada que el macho. Su plumaje es color chocolate con las alas más oscuras que el cuerpo, mientras que el macho tiene las alas color blanco sucio con las puntas negras, la cola blanca y el cuerpo pardo medio e incluso algo rojizo. Para cazar sobrevuelan a baja altura los aneales hasta que localizan a su presa, dejándose caer sobre ellas de forma vistosa. La destrucción de los humedales son su mayor amenaza, algo que hizo que su población disminuyera de forma drástica a mediados del siglo pasado. Aunque su población está recuperando lentamente, aún aparece en la categoría "De interés especial" en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.

Noviembre 15



Fotos: Rafael Mateos

¿Qué come?

Tiene una dieta muy variada incluyendo todo tipo de pequeños y medianos vertebrados, que localiza tanto en el suelo como en el agua. Pequeños mamíferos como roedores y conejos, aves, reptiles y en menor medida anfibios, peces, grandes insectos, huevos e incluso carroña cuando escasean las presas.



Invernante



Pocos Ejemplares

Centro de Educación Medioambiental
RNC La Charca de Suárez



GESTIÓN DEL TERRITORIO
Y MEDIO AMBIENTE